

BG併用療法<2クール目以降>(外来)

			休薬終了日
	Day1	Day2	Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 ガザイバ投与30~60分前に内服 ☆☆別バック☆☆ 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】デカロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌々日から内服開始 2日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトリル) … 1 管 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ 用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 トリアキシン点滴静注液【規格分解用】 … 1mg 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL (mL用) … 210ml ガザイバ点滴静注1000mg【規格分解 … 1000mg 朝 点滴 … 1 0.2μmのインラインフィルターを通して投与 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトリル) … 1 管 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 トリアキシン点滴静注液【規格分解用】 … 1mg 10分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ 用 点滴 … 1 1回</p>	