

		休薬終了日
	Day1	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 リツキシマブ投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>プレドニゾン錠「タタ」5mg … 20錠 1日3回 毎食後 … 1 朝食後 10 昼食後 6 夕食後 4 ☆☆別パック☆☆ 5日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ソル・ユー・テフ注射用(100mg) … 1瓶 グラセロン静注液1mg「NIG」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤】… 0.9mL リツキシマブ注【規格分解用】… 1mg 朝 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 経過観察用 60分間かけて 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ホライビ-注【規格分解用】… 1mg 90分間かけて 点滴 … 1 ホライビ-30mgに対し蒸留水1.8mLで溶解 0.2μmのインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 経過観察用 60分間かけて 1回</p> <hr/> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 エトキシサン注[CPA/CPM]【規格分解用】… 1mg 90分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アトリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	