

CBDCA+PTX+ペバシズマブ

		休薬終了日
		Day1
		Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコ-7錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 3瓶 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 全開 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトリル) … 1管 30分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 テルモ糖注5% (500mL) … 1袋 バクシケル注【規格分解用】 … 1mg 180分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 テルモ糖注5% (250mL) … 1袋 カルボプラチン注【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 アバステン注【規格分解用】 … 1mg 初回投与は90分、問題なければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 1回</p>	